

## Traitement du rachitisme vitamino résistant selon l'âge et prix

Age	Phosphoneuros	Prix mensuel	Rocaltrol 0,25micro g	prix mensuel	Total mensuel	à l'Année
	120ml = 2800 gouttes		boîte de 30 capsules à 7,8 €			
	1ml = 24 gouttes		0,26 € la capsule			
	prix 4,51€ pour 120ml		4 gélules pour 1 €			
	prix 100 gouttes 0,15€					
0 à 5 ans	50 gouttes par jour en 4 prises de 0,25ml	2,25 €	0,75 à 1 micro g en une prise	23 à 30 €	30 €	360 €
5 à 10 ans	75 gouttes par jour en 3 prises de 0,5 ml	3,70 €	1 à 2 micro g en une prise	30 à 60 €	48 €	576 €
>10 ans	120 à 150 gouttes par jour en 3 prises de 0,4 ou 0,5 ml	6 à 7€	1,5 à 3 micro g en une prise	46,8 à 90 €	80 €	960 €

**Tableau 4**

Doses indicatives des différents traitements utilisés pour les hypophosphatémies à FGF-23 élevé (d'après la référence [15]).

	Phosphate oral	Analogue actif de la vitamine D (alfacalcidol <sup>b</sup> )	Vitamine D
0-5 ans	55-70 mg/kg/j <sup>a</sup> en 4 prises <i>po</i>	1,25-2 µg/j <sup>b</sup> en 1 prise <i>po</i>	Selon les recommandations nationales
5 ans - début puberté	45-60 mg/kg/j <sup>a</sup> en 3 prises	1,0-2 µg/j <sup>b</sup> en 1 prise <i>po</i>	
Adolescence	35-50 mg/kg/j <sup>a</sup> en 3 prises <i>po</i>	1,5-3 µg/j <sup>b</sup> en 1 prise <i>po</i>	
Adulte	0-2000 mg/j <sup>a</sup> en 2 prises <i>po</i>	0-2 µg/j <sup>b</sup> en 1 prise <i>po</i>	Correction d'une éventuelle carence puis 1 ampoule tous les 2 mois <sup>a</sup>
Grossesse	0-2000 mg/j <sup>a</sup> en 2 prises <i>po</i>	1-1,5 µg/j <sup>b</sup> en 1 prise <i>po</i>	Correction d'une carence puis 80 000 UI tous les 2 mois et une ampoule systématique au 6 <sup>e</sup> mois de grossesse
Ménopause	0-2000 mg/j <sup>a</sup> en 2 prises <i>po</i>	0-2 µg/j <sup>a</sup> en 1 prise <i>po</i>	Correction d'une carence puis 80 000 UI tous les 2 mois

<sup>a</sup> Les doses en phosphore élément sont données à titre indicatif et doivent être ajustées par l'équipe médicale. En particulier les doses les plus basses sont utilisées chez les enfants diagnostiqués dès la naissance.

<sup>b</sup> Seules les doses d'alfacalcidol sont indiquées. Il faut diviser ces chiffres par 2 pour obtenir les doses indicatives de calcitriol.